数値計算：射影

平井 慎一

立命館大学 ロボティクス学科

講義の流れ

1. 正規方程式と射影行列
2. 正規直交系への射影
3. グラム・シュミットの直交化
4. QR 分解とその応用
5. まとめ

変数の個数より式の数が多い連立一次方程式

変数の個数が 2，式の数が 3 である連立一次方程式

$$\begin{cases} 1x & +0y & = & 1 \\ 2x & -1y & = & 6 \\ -1x & +1y & = & -2 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

解を持たない

変数の個数より式の数が多い連立一次方程式

行列表現

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

を満たす x, y が存在しない

変数の個数より式の数が多い連立一次方程式



係数行列の第 1 列と第 2 列のベクトル

$$\boldsymbol{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$ 三次元空間内のベクトル

変数の個数より式の数が多い連立一次方程式



一次結合

$$\boldsymbol{a}_1 x + \boldsymbol{a}_2 y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} y$$

$\Longrightarrow$ 二つのベクトル $\boldsymbol{a}_1$ と $\boldsymbol{a}_2$ を含む平面内

変数の個数より式の数が多い連立一次方程式



定数ベクトル

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$ 平面上にない

$\Longrightarrow$ 左辺と右辺が等しくなる x, y は存在しない $\Longrightarrow$ 解が無い

曲線のフィッティング

t	1	2	3	4	5
x	1.1333	0.4667	1.6000	3.5333	5.6667



曲線のフィッティング

2 次式 $x = a + bt + ct^2$ で近似

$$
\begin{aligned}
a + b \cdot 1 + c \cdot 1^2 &= 1.1333 \\
a + b \cdot 2 + c \cdot 2^2 &= 0.4667 \\
a + b \cdot 3 + c \cdot 3^2 &= 1.6000 \\
a + b \cdot 4 + c \cdot 4^2 &= 3.5333 \\
a + b \cdot 5 + c \cdot 5^2 &= 5.6667
\end{aligned}
$$

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1^2 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ 1 & 3 & 3^2 \\ 1 & 4 & 4^2 \\ 1 & 5 & 5^2 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} 1.1333 \\ 0.4667 \\ 1.6000 \\ 3.5333 \\ 5.6667 \end{bmatrix}
$$

曲線のフィッティング

t	1	2	3	4	5
x	1.1333	0.4667	1.6000	3.5333	5.6667



曲線のフィッティング

t	0	1	2	3	4
x	-0.6000	0.4091	0.9383	1.3563	2.4271
	5	6	7	8	9
	0.6000	-0.0091	-1.5383	-2.3563	-1.2271
	10	11	12	13	14
	-0.4000	-0.1909	1.5383	1.7563	2.2271
	15	16	17	18	19
	0.6000	-0.8091	-0.7383	-2.3563	-1.6271
	20				
	-0.6000				

曲線のフィッティング

t	0	1	2	3	4	$\cdots$
x	-0.6000	0.4091	0.9383	1.3563	2.4271	$\cdots$



曲線のフィッティング

$x = A\sin((2\pi/10)t - \delta)$ で近似

$$\begin{aligned} x &= A\sin((2\pi/10)t - \delta) \\ &= A\{\sin(2\pi/10)t\ \cos\delta - \cos(2\pi/10)t\ \sin\delta\} \\ &= A\cos\delta\ \sin(2\pi/10)t - A\sin\delta\ \cos(2\pi/10)t \end{aligned}$$

$p = A\cos\delta,\ q = A\sin\delta$ とおくと

$$x = p\sin(2\pi/10)t - q\cos(2\pi/10)t$$

曲線のフィッティング

$$
\begin{aligned}
p\sin((2\pi/10)0) - q\cos((2\pi/10)0) &= -0.6000 \\
p\sin((2\pi/10)1) - q\cos((2\pi/10)1) &= 0.4091 \\
p\sin((2\pi/10)2) - q\cos((2\pi/10)2) &= 0.9383 \\
p\sin((2\pi/10)3) - q\cos((2\pi/10)3) &= 1.3563 \\
p\sin((2\pi/10)4) - q\cos((2\pi/10)4) &= 2.4271 \\
&\cdots
\end{aligned}
$$

$$
\begin{bmatrix}
\sin((2\pi/10)0) & -\cos((2\pi/10)0) \\
\sin((2\pi/10)1) & -\cos((2\pi/10)1) \\
\sin((2\pi/10)2) & -\cos((2\pi/10)2) \\
\sin((2\pi/10)3) & -\cos((2\pi/10)3) \\
\sin((2\pi/10)4) & -\cos((2\pi/10)4) \\
\cdots & \cdots
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}
-0.6000 \\ 0.4091 \\ 0.9383 \\ 1.3563 \\ 2.4271 \\ \cdots
\end{bmatrix}
$$

曲線のフィッティング

p, q の値から A, δ の値を計算

$$p = A\cos\delta$$
$$q = A\sin\delta$$

$$\Downarrow$$

$$A = \sqrt{p^2 + q^2}$$
$$\delta = \mathrm{atan2}\,(q, p)$$

曲線のフィッティング

t	0	1	2	3	4	$\cdots$
x	-0.6000	0.4091	0.9383	1.3563	2.4271	$\cdots$



誤差最小解

係数行列

$$A = \begin{bmatrix} & \\ \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 \\ & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

変数ベクトル

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

誤差最小解



誤差が最小となる解 $\Longrightarrow$
定数ベクトル $\boldsymbol{b}$ から列ベクトル $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$ が定める平面への垂線

垂線の足

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{a}_1 x + \boldsymbol{a}_2 y = A\boldsymbol{x}$$

誤差最小解



垂線に沿うベクトル

$$\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}$$

ベクトル $\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}$ が平面に直交

$$\boldsymbol{a}_1 \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{a}_2 \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}$$

誤差最小解

$$\boldsymbol{a}_1 \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{a}_2 \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}, \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \perp \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x} \\ \\ \end{bmatrix} = 0, \qquad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x} \\ \\ \end{bmatrix} = 0$$

誤差最小解

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x} \\ \\ \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x} \\ \\ \end{bmatrix} = 0$$

誤差が最小になるための条件

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x} \\ \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

誤差最小解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

誤差が最小になるための条件

$$A^\top(\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$$

誤差最小解

正規方程式

$$A^\top A\boldsymbol{x} = A^\top \boldsymbol{b}$$

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$ 正定対称行列

行列 A がフルランク $\Longrightarrow$ $A^\top A$ は正定対称行列

$\Longrightarrow$ 正規方程式は必ず解くことができる

射影行列

正規方程式 $A^\top A\boldsymbol{x} = A^\top \boldsymbol{b}$ を解く

$$\boldsymbol{x} = (A^\top A)^{-1} A^\top \boldsymbol{b}$$

このとき

$$\boldsymbol{p} = A\boldsymbol{x} = A(A^\top A)^{-1} A^\top \boldsymbol{b}$$

射影行列

$$A(A^\top A)^{-1} A^\top$$

射影行列



射影行列 $P = A(A^\top A)^{-1}A^\top$:
任意のベクトル $\boldsymbol{b}$ を係数行列 A の列ベクトルから成る空間に写像

$$\boldsymbol{b} \xrightarrow{P\times} P\boldsymbol{b}$$

射影行列

例　行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

の射影行列

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x-y 平面への射影

射影行列

例　行列

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

の射影行列

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x-y 平面への射影

射影行列

例　単位ベクトル $\boldsymbol{q}$ から成る行列

$$A = \begin{bmatrix} \\ \boldsymbol{q} \\ \\ \end{bmatrix}$$

の射影行列　(注意：$A^\top = \boldsymbol{q}^\top$ なので $A^\top A = \boldsymbol{q}^\top \boldsymbol{q} = 1$)

$$A(A^\top A)^{-1} A^\top = \boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^\top$$

方向ベクトル $\boldsymbol{q}$ で定められる直線への射影



射影行列

例　正則行列

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

の射影行列　(注意：行列 A は正則なので $(A^\top A)^{-1} = A^{-1}(A^\top)^{-1}$)

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top = AA^{-1}(A^\top)^{-1}A^\top = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

全空間への射影 $\equiv$ 恒等変換

射影行列の性質

列の交換

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

行列 A の射影行列 $=$ 行列 B の射影行列

列の定数倍の加算

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 + 5\boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

行列 A の射影行列 $=$ 行列 B の射影行列

射影行列の性質

列の定数 (非零) 倍

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

行列 A の射影行列 $=$ 行列 B の射影行列

射影行列は列の基本変換に関して不変

射影行列の性質

$$
\begin{aligned}
B &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= AR \quad (\text{正方行列 } R \text{ は正則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{行列 } B \text{ の射影行列} &= B(B^\top B)^{-1}B^\top \\
&= (AR)(R^\top A^\top AR)^{-1}(R^\top A^\top) \\
&= ARR^{-1}(A^\top A)^{-1}(R^\top)^{-1}R^\top A^\top \\
&= A(A^\top A)^{-1}A^\top \\
&= \text{行列 } A \text{ の射影行列}
\end{aligned}
$$

射影行列の性質

$$
\begin{aligned}
B &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 + 5\boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= AR \quad (\text{正方行列 } R \text{ は正則})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
B &= \begin{bmatrix} 6\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= AR \quad (\text{正方行列 } R \text{ は正則})
\end{aligned}
$$

射影行列の性質

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$ の射影行列

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$ の射影行列 (1 列と 2 列を交換)

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$ の射影行列 (1 列に 2 列の 3 倍を加算)

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$ の射影行列 (正規化：1 列を (1/5) 倍)

射影行列の性質

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{5} \\ 0 & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \text{の射影行列 (正規化：2 列を } (1/\sqrt{5}) \text{ 倍)}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & -2/5 \\ 0 & -2/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

射影行列の性質

例　行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

の射影行列

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 6 & -12 \\ -12 & 24 \end{bmatrix}$$

行列 $A^\top A$ は正則でない　$\Longrightarrow$　逆行列 $(A^\top A)^{-1}$ が存在しない

$\Longrightarrow$　定義式では計算できない

射影行列の性質

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{の射影行列}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{の射影行列} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{の射影行列}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{bmatrix} \text{の射影行列}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

射影行列の性質

以下の行列の射影行列を求めよ.

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 & -3 \\ -3 & -5 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$B = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

正規直交系

正規直交系

ベクトルの組が正規直交系

$$\Downarrow$$

正規：各ベクトルの大きさが 1 である
直交：ベクトルがたがいに直交している

正規直交系

ベクトル

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix}$$

の内積

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{b}$$

ベクトル $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ が直交 $\Longrightarrow \quad \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{b} = 0$

ベクトル $\boldsymbol{a}$ の大きさが 1 $\Longrightarrow \| \boldsymbol{a} \| = 1$

$\Longrightarrow \| \boldsymbol{a} \|^2 = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{a} = 1$

正規直交系

二つのベクトル $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$ が正規直交系

$$
\begin{aligned}
&\text{正規} \quad \| \boldsymbol{q}_1 \| = 1, \quad \| \boldsymbol{q}_2 \| = 1 \\
&\text{直交} \quad \boldsymbol{q}_1 \perp \boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$\Downarrow$$

$$
\begin{aligned}
&\text{正規} \quad \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_1 = 1, \quad \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_2 = 1 \\
&\text{直交} \quad \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_2 = \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_1 = 0
\end{aligned}
$$

$$\Downarrow$$

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_1 = 1, \quad \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_2 = 0, \\
&\boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_1 = 0, \quad \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_2 = 1
\end{aligned}
$$

正規直交系

三つのベクトル $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ が正規直交系

$$
\begin{array}{ll}
\text{正規} & \| \boldsymbol{q}_1 \| = 1, \quad \| \boldsymbol{q}_2 \| = 1, \quad \| \boldsymbol{q}_3 \| = 1 \\
\text{直交} & \boldsymbol{q}_1 \perp \boldsymbol{q}_2, \quad \boldsymbol{q}_1 \perp \boldsymbol{q}_3, \quad \boldsymbol{q}_2 \perp \boldsymbol{q}_3
\end{array}
$$

$$
\Downarrow
$$

$$
\begin{array}{lll}
\boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_1 = 1, & \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_2 = 0, & \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_3 = 0, \\
\boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_1 = 0, & \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_2 = 1, & \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_3 = 0, \\
\boldsymbol{q}_3^\top \boldsymbol{q}_1 = 0, & \boldsymbol{q}_3^\top \boldsymbol{q}_2 = 0, & \boldsymbol{q}_3^\top \boldsymbol{q}_3 = 1
\end{array}
$$

正規直交系への射影

正規直交系を成す二つのベクトル $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$ を列ベクトルとする行列 A

$$A = \begin{bmatrix} & \\ \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 \\ & \end{bmatrix}$$

正規方程式の係数行列 $A^\top A$

$$A^\top A = \begin{bmatrix} & \\ \boldsymbol{q}_1^\top & \\ \boldsymbol{q}_2^\top & \\ & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & \\ \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 \\ & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_1^\top \boldsymbol{q}_2 \\ \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2^\top \boldsymbol{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$ A は直交行列

正規直交系への射影

射影行列

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1^\top \\ \boldsymbol{q}_2^\top \end{bmatrix} = \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^\top + \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^\top$$

ベクトル $\boldsymbol{b}$ の射影

$$\begin{aligned} A(A^\top A)^{-1}A^\top \boldsymbol{b} &= (\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^\top)\,\boldsymbol{b} + (\boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^\top)\,\boldsymbol{b} \\ &= (\boldsymbol{b}^\top\boldsymbol{q}_1)\,\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{b}^\top\boldsymbol{q}_2)\,\boldsymbol{q}_2 \end{aligned}$$

右辺の第 1 項：ベクトル $\boldsymbol{b}$ の単位ベクトル $\boldsymbol{q}_1$ への射影
右辺の第 2 項：ベクトル $\boldsymbol{b}$ の単位ベクトル $\boldsymbol{q}_2$ への射影

正規直交系への射影

正規直交系への射影

行列 A が直交行列
行列 A の各列ベクトルへの射影を独立に計算し加算

各列ベクトルへの射影



逆行列を計算する必要がない

グラム・シュミットの直交化

グラム・シュミットの直交化

ベクトルの組 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$

$$\Downarrow$$

正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ が定める空間 $\equiv$ ベクトル $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ が定める空間

グラム・シュミットの直交化

$$A = \begin{bmatrix} & & \\ \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \\ & & \end{bmatrix}$$

ベクトル $\boldsymbol{a}_1 \implies$ 正規直交系 $\boldsymbol{q}_1$
$\boldsymbol{a}_1$ が定める空間 $\equiv$ $\boldsymbol{q}_1$ が定める空間

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2 \implies$ 正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$
$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ が定める空間 $\equiv$ $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$ が定める空間

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3 \implies$ 正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$
$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ が定める空間 $\equiv$ $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ が定める空間

グラム・シュミットの直交化



ベクトル $a_1 \implies$ 正規直交系 q_1

$$b_1 = a_1,$$

$$q_1 = \frac{b_1}{\| b_1 \|}$$

グラム・シュミットの直交化



ベクトル $a_1, a_2 \implies$ 正規直交系 q_1, q_2

$$b_2 = a_2 - (a_2^\top q_1) q_1,$$

$$q_2 = \frac{b_2}{\| b_2 \|}$$

グラム・シュミットの直交化



$$b_2 = a_2 - (a_2^\top q_1) q_1$$

右辺の第 2 項 $(a_2^\top q_1) q_1$:
ベクトル a_2 を単位ベクトル q_1 が定める直線へ射影

$$\Downarrow$$

$$b_2 \perp q_1$$

グラム・シュミットの直交化



ベクトル $a_1, a_2, a_3 \implies$ 正規直交系 q_1, q_2, q_3

$$b_3 = a_3 - (a_3^\top q_1) q_1 - (a_3^\top q_2) q_2,$$

$$q_3 = \frac{b_3}{\| b_3 \|}$$

グラム・シュミットの直交化



$$b_3 = a_3 - \{(a_3^\top q_1)q_1 + (a_3^\top q_2)q_2\}$$

右辺の第 2 項 $(a_3^\top q_1)q_1 + (a_3^\top q_2)q_2$ ：
ベクトル a_3 をベクトル q_1, q_2 が定める平面へ射影

$$\Downarrow$$

$$b_3 \perp q_1, q_2$$

QR分解

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ を正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ を用いて表す

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_1 &= \| \boldsymbol{b}_1 \| \boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_2 &= \| \boldsymbol{b}_2 \| \boldsymbol{q}_2 + (\boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_3 &= \| \boldsymbol{b}_3 \| \boldsymbol{q}_3 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$
\Downarrow
$$

$$
\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ 0 & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ 0 & 0 & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}
$$

QR分解

ベクトル a_1, a_2, a_3 を正規直交系 q_1, q_2, q_3 を用いて表す

$$
\begin{aligned}
a_1 &= \| b_1 \| q_1 \\
a_2 &= \| b_2 \| q_2 + (a_2^\top q_1) q_1 \\
a_3 &= \| b_3 \| q_3 + (a_3^\top q_1) q_1 + (a_3^\top q_2) q_2
\end{aligned}
$$

$$
\Downarrow
$$

$$
\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \| b_1 \| & a_2^\top q_1 & a_3^\top q_1 \\ 0 & \| b_2 \| & a_3^\top q_2 \\ 0 & 0 & \| b_3 \| \end{bmatrix}
$$

QR分解

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ を正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ を用いて表す

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_1 &= \| \boldsymbol{b}_1 \| \boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_2 &= \| \boldsymbol{b}_2 \| \boldsymbol{q}_2 + (\boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_3 &= \| \boldsymbol{b}_3 \| \boldsymbol{q}_3 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$\Downarrow$$

$$
\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ 0 & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ 0 & 0 & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}
$$

QR分解

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ を正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ を用いて表す

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_1 &= \| \boldsymbol{b}_1 \| \boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_2 &= \| \boldsymbol{b}_2 \| \boldsymbol{q}_2 + (\boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_3 &= \| \boldsymbol{b}_3 \| \boldsymbol{q}_3 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$
\Downarrow
$$

$$
\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ 0 & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ 0 & 0 & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}
$$

QR分解

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ を正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ を用いて表す

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_1 &= \| \boldsymbol{b}_1 \| \boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_2 &= \| \boldsymbol{b}_2 \| \boldsymbol{q}_2 + (\boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_3 &= \| \boldsymbol{b}_3 \| \boldsymbol{q}_3 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$
\Downarrow
$$

$$
\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ 0 & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ 0 & 0 & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}
$$

QR分解

ベクトル $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ を正規直交系 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \boldsymbol{q}_3$ を用いて表す

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_1 &= \| \boldsymbol{b}_1 \| \boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_2 &= \| \boldsymbol{b}_2 \| \boldsymbol{q}_2 + (\boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 \\
\boldsymbol{a}_3 &= \| \boldsymbol{b}_3 \| \boldsymbol{q}_3 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2
\end{aligned}
$$

$$\Downarrow$$

$$
\underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_3 \end{bmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ 0 & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ 0 & 0 & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}}_{R}
$$

QR 分解

QR 分解

行列 A を直交行列 Q と上三角行列 R の積で表す

$$A = QR$$

$$Q = \begin{bmatrix} & & \\ \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \boldsymbol{q}_2 \\ & & \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \| \boldsymbol{b}_1 \| & \boldsymbol{a}_2^\top \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_1 \\ & \| \boldsymbol{b}_2 \| & \boldsymbol{a}_3^\top \boldsymbol{q}_2 \\ & & \| \boldsymbol{b}_3 \| \end{bmatrix}$$

正規方程式

$$A = QR, \qquad A^\top = (QR)^\top = R^\top Q^\top$$

$$A^\top A = R^\top Q^\top QR = R^\top (Q^\top Q) R = R^\top R$$

正規方程式 $A^\top A \boldsymbol{x} = A^\top \boldsymbol{b}$

$$R^\top R \boldsymbol{x} = R^\top Q^\top \boldsymbol{b}$$

行列 A がフルランク $\Longrightarrow$ 上三角行列 R は正則

$\Longrightarrow$ 下三角行列 $R^\top$ は正則

$\Longrightarrow$ 逆行列 $(R^\top)^{-1}$ が存在

正規方程式

$$R \boldsymbol{x} = Q^\top \boldsymbol{b}$$

最後の式から順次解くことにより解を求める

射影

行列 $A = QR$ の射影行列

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top = (QR)(R^\top R)^{-1}(QR)^\top$$

行列 A がフルランク $\Longrightarrow$ 上三角行列 R は正則

$$\Longrightarrow (R^\top R)^{-1} = R^{-1}(R^\top)^{-1}$$

射影行列

$$\begin{aligned} A(A^\top A)^{-1}A^\top &= QRR^{-1}(R^\top)^{-1}R^\top Q^\top \\ &= QQ^\top \\ &= \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^\top + \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^\top + \boldsymbol{q}_3\boldsymbol{q}_3^\top \end{aligned}$$

行列 A の射影行列 $\equiv$ 直交行列 Q の射影行列

MATLAB

行列 A がフルランクである場合

ファイル qr_decompose.m

```
A = [ 2, 1;...
      1, 2;...
      0, 0 ];
[Q,R] = qr(A,0);
```

MATLAB

```
>> qr_decompose
>> Q
Q =

   -0.8944   -0.4472
   -0.4472    0.8944
         0         0

>> R
R =

   -2.2361   -1.7889
         0    1.3416
```

MATLAB

```
>> A
A =

     2     1
     1     2
     0     0

>> Q*R
ans =

    2.0000    1.0000
    1.0000    2.0000
         0         0
```

MATLAB

射影行列の計算

```
>> Q*Q'

ans =

    1.0000   -0.0000         0
   -0.0000    1.0000         0
         0         0         0
```

MATLAB

行列 A がフルランクでない可能性がある場合

ファイル qr_decompose_rank_deficient.m

```
A = [ 0, 0, 0; ...
      1, 2, 2; ...
      2, 4, 1 ];
[Q,R,index] = qr(A,0);
```

MATLAB

```
>> Q
Q =

         0         0   -1.0000
   -0.4472   -0.8944   -0.0000
   -0.8944    0.4472    0.0000

>> R
R =

   -4.4721   -1.7889   -2.2361
         0   -1.3416         0
         0         0   -0.0000
```

MATLAB

```
>> Q*R
ans =
           0           0      0.0000
    2.0000      2.0000      1.0000
    4.0000      1.0000      2.0000

>> A(:,index)
ans =
     0     0     0
     2     2     1
     4     1     2
```

index の添え字に従って行列 A の各列を並べ替えると QR に一致

MATLAB

射影行列の計算

```
n = rank(R);
P = Q(:,1:n)*Q(:,1:n)';
```

```
>> P
P =

         0         0         0
         0    1.0000    0.0000
         0    0.0000    1.0000
```

ノルム最小解

変数 x, y, z, w

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

(α, β は任意のパラメータ)

最も原点に近い変数の組 (ノルム最小解) を求める

ノルム最小解

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + A\boldsymbol{\alpha}$$

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

ノルム最小解



x の集合：点 x_0 を通る二次元平面
行列 A の列ベクトル a_1, a_2：平面の向きを定める

点 x_0 からノルム最小解に至るベクトル
$\Longrightarrow$ ベクトル $(-x_0)$ の行列 A が定める平面への射影

ノルム最小解



行列 A の射影行列：$P = A^\top (A^\top A)^{-1} A$
点 x_0 からノルム最小解に至るベクトル：$P(-x_0)$

ノルム最小解

$$x_0 + P(-x_0) = x_0 - Px_0$$

ノルム最小解

行列 A を QR 分解　　行列 Q の列ベクトル

$$\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

射影

$$P\boldsymbol{x}_0 = (\boldsymbol{x}_0^\top \boldsymbol{q}_1)\boldsymbol{q}_1 + (\boldsymbol{x}_0^\top \boldsymbol{q}_2)\boldsymbol{q}_2$$

$$= (\sqrt{6})\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-2\sqrt{14})\frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

ノルム最小解

ノルム最小解

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 - P\boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

最小ノルム

$$\| \boldsymbol{x} \| = \sqrt{22}$$

まとめ

正規方程式と射影行列

- 正規方程式

$$A^\top A\boldsymbol{x} = A^\top \boldsymbol{b}$$

- 射影行列

$$A(A^\top A)^{-1}A^\top$$

QR 分解

- グラム・シュミットの直交化
- 行列 A を直交行列 Q と上三角行列 R の積で表す

$$A = QR$$

- ノルム最小解への応用

レポート (MATLAB Grader)

MATLAB grader 「射影」
締切：2026 年 6 月 8 日（月曜）01:00 AM